

DOPO LA COLPOSCOPIA,  
PER QUANTO DEVO ASSENTARMI  
DAL LAVORO?

Dopo l'esame è possibile  
tornare a casa o al lavoro.

Meglio astenersi per 24 ore dalle attività  
sportive, se si è effettuata la biopsia e  
attendere la fine delle perdite ematiche  
per riprendere l'attività sessuale,  
l'utilizzo di tamponi, creme vaginali e pessari.

QUANDO POTRO' AVERE  
I RISULTATI DELL'ESAME?

Se non viene praticato il prelievo bioptico,  
il ginecologo darà immediatamente conto  
dell'esito dell'esame.

In caso di biopsia,  
i tempi di attesa sono quelli  
di un esame istologico: 10-15 giorni.

RICORDIAMO CHE  
PRESSO IL CENTRO MEDICO  
E' POSSIBILE EFFETTUARE:

ECOGRAFIE OSTETRICHE  
Datazione, Morfologica, Accrescimento

TRANSLUCENZA NUCALE

FLUSSIMETRIA

ECOGRAFIA 3D / 4D IN GRAVIDANZA

ECOGRAFIA GINECOLOGICA  
Pelvica - Sovrapubica o Transvaginale

PAP-TEST

COLPOSCOPIA

SONOISTEROGRAFIA

RIABILITAZIONE PAVIMENTO PELVICO

CONSULENZA OSTETRICA

CONSULENZA SESSUOLOGICA

TRATTAMENTO DEL VAGINISMO

DIETOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

FISIOTERAPIA

DIAGNOSTICA ED ECOGRAFIE

**HTC**

Via M. Partigiani 33  
STRADELLA (PV)

0385 246861

[www.htcnet.it](http://www.htcnet.it)

CentroMedicoHTC

DIAGNOSTICA ED ECOGRAFIE

LA COLPOSCOPIA






## LA COLPOSCOPIA

La Colposcopia è un esame che serve ad evidenziare e differenziare anomalie delle cellule del collo dell'utero, generalmente a seguito di un Pap-test positivo.

E' utile anche nella diagnosi di infezioni da HPV, HV, verruche genitali, o per indagare la causa di sanguinamenti vaginali atipici o dolori pelvici.




### IN CHE MODO AVVIENE LA COLPOSCOPIA?

Come durante una normale visita ginecologica, la paziente si mette sul lettino e la vagina viene dilatata con lo speculum.

Lo studio del collo dell'utero (cervice) avviene tramite il colposcopio, uno strumento ottico che consente di illuminare e ingrandire l'immagine della cervice da 6 fino a 40 volte.

Durante l'esame vengono applicati dei liquidi reagenti che servono ad evidenziare eventuali anomalie cellulari.

Nel corso dell'esame, se il ginecologo lo considera necessario, verranno effettuati dei piccoli prelievi di tessuto (biopsia) oppure potrebbero essere trattate o asportate delle parti che presentano anomalie (colposcopia operativa).



### ESISTONO CONTROINDICAZIONI ALL'ESAME?

La colposcopia non può essere eseguita durante la mestruazione (in genere viene scelto un periodo a metà del ciclo) o in presenza di forti infiammazioni o distrofie post-menopausali.

La gravidanza non costituisce una controindicazione assoluta all'esecuzione dell'esame, ma va segnalata al ginecologo.

### E' NECESSARIA UNA PREPARAZIONE PARTICOLARE?

Non è necessaria una preparazione particolare per eseguire l'esame.

Bisogna però astenersi dai rapporti sessuali almeno 24 ore prima dell'esame, così come evitare di utilizzare tamponi, pessari, creme e irrigazioni vaginali nelle 48 ore che precedono la colposcopia.

## DEVO FARMI ACCOMPAGNARE DA QUALCUNO?

Non è necessario essere accompagnate. Dopo l'esame è possibile guidare.



### E' UN ESAME DOLOROSO? MI DEVO ASPETTARE DELLE CONSEGUENZE?

L'esame non è doloroso e dura dai 15 ai 30 minuti.

Può essere avvertito solo un leggero fastidio (bruciore), al momento della applicazione dei liquidi reagenti o un pizzicore, se venisse effettuata la biopsia.

Perdite scure che compaiono dopo l'esame, non devono preoccupare.